

■睡眠薬

	一般名	商品名	用量用法	作用/副作用				備考	
				催眠	筋弛緩	抗痙攣	依存性		
超短時間	非ベンゾ系	スボレキサント	ベルソムラ	15-20mg	±	0	0	0	オレキシン受容体拮抗薬
		ラメルテオン	ロゼレム	8mg	±	0	0	0	メラトニン受容体作動薬 ※継続投与併用禁忌:フルボキサミン
		ゾルピデム	マイスリー	5-10mg	+	±	0	±	翌朝にやや苦味
		エスゾピクロン	ルネスタ	1-3mg					
		ゾピクロン	アモバン	7.5-10mg					
短時間	ベンゾ系	トリアゾラム	ハルシオン	0.125-0.5mg	++	+	±	++	夜間せん妄 禁忌:アゾール系抗真菌薬
		リルマザホン	リスミー	1-2mg	+	+	±	+	
		ブロチゾラム	レンドルミン	0.25mg	+	+	±	+	
		ロルメタゼパム	ロラメット	1-2mg	+	+	±	+	重度肝障害:投与可
中時間	ベンゾ系	エスタゾラム	ユーロジン	1-4mg	+	+	±	+	
		フルニトラゼパム	サイレース	1-2mg	++	++	±	++	注射剤
長時	ベンゾ系	ニトラゼパム	ベンザリン	5-10mg	+	++	++	+	
		クアゼパム	ドラール	15-30mg	+	+	±	+	
		フルラゼパム	ダルメート	15-30mg	+	+	±	+	

■抗不安薬

		一般名	商品名	用量用法	作用/副作用				備考
					抗不安	筋弛緩	抗痙攣	依存性	
短時間	非	タンドスピロン	セディール	5-60mg/1-3x	±	0	0	0	セロトニン作動性
		トフィソパム	グランダキシシ	50-150mg/1-3x	±	±	±	±	自律神経調節作用
		クロチアゼパム	リーゼ	5-30mg/1-3x	+	±	±	±	
		エチゾラム	デパス	0.25-3mg/1-3x	++	++	±	++	催眠作用
中時間	ベンゾ系	アルプラゾラム	ソラナックス	0.4-2.4mg/1-3x	+	+	±	+	制吐作用
		ロラゼパム	ワイパックス	0.5-3mg/1-3x	+	+	±	+	重度肝障害:投与可
		ブロマゼパム	レキソタン	1-15mg/1-3x	+	+	±	++	
長時間	ベンゾ系	クロキサゾラム	セパゾン	1-12mg/1-3x	++	+	+	++	
		ジアゼパム	セルシン	2-15mg/1-3x	+	++	++	+	注射剤は緩徐静注 坐剤
			ダイアップ	4-10mg/1x					
		クロナゼパム	リボトリール	0.5-6mg/1-3x	+	++	++	+	抗てんかん薬 気分安定作用
超		ロフラゼプ	メイラックス	1-2mg/1x	+	+	+	+	半減期:2週間

● 運転制限

	注意	禁止
睡眠薬	—	全て
抗不安薬	—	全て
抗精神病薬	—	全て
抗うつ薬	SSRI(ルボックスを除く)、SNRI	左記以外の全て
気分安定薬	—	全て
抗認知症薬	レミニール	左記以外の全て
その他	—	全て

● 期間制限

	14日	90日または制限なし	30日
睡眠薬	ラボナ	ベルソムラ、ロゼレム、ルネスタ リスミー、ベンザリン	左記以外の全て
抗不安薬	—	セディール、グランダキシン、 セルシン、ランドセン、フェノバル	左記以外の全て
抗精神病薬	—	全て	—
抗うつ薬	—	全て	—
気分安定薬	—	全て	—
抗認知症薬	—	全て	
その他	—	右記以外の全て	コンサータ

■アルコール依存症治療薬

	一般名	商品名	用量用法	剤型	半減期	備考
抗酒薬	シアナミド	シアナマイド	7ml/1x朝	液剤	1日	アルデヒド脱水酸化酵素阻害薬 →少量飲酒で二日酔いを作り出す 禁忌:多量飲酒→劇症肝炎
	ジスルフィラム	ノックビン	0.1g/1x朝	粉末剤	1-2週	
抗渴望薬	アカンプロサート	レグテクト	2g/3x			飲酒欲求の抑制

■抗精神病薬

	一般名	商品名	用量用法	作用			副作用			備考					
				抗幻妄	気分安	鎮静	振戦	便秘	高血糖						
第2世代	SDAM	ブレクスピプラゾール	レキササルティ	1-2mg/1x											
	DPA	アリピプラゾール	エビリファイ	3-30mg/1x朝	+	+	+	0	0	0	外来レベル筋注剤				
				300-400mg/4w							持続性筋注剤				
	SDA	パリペリドン	インヴェガ	3-12mg/1x朝	+	0	0	+	+	+	持続性筋注剤				
			ゼプリオン	25-150mg/4w											
		リスパダール	リスパダール	1-12mg/1-2x			+				0	+	+	+	持続性筋注剤
			リスパダールコンスタ	25-50mg/2w											
		ブロナンセリン	ロナセン	8-24mg/2x			0				0	禁忌: アゾール系抗真菌薬			
	ペロスピロン	ルーラン	12-48mg/3x												
	MARTTA	アセナピン	シクレスト	10-20mg/2x	+	++	++	+	±	±	舌下錠				
オランザピン		ジプレキサ	2.5-20mg/1x	+	++	++	+	+	筋注剤	禁忌: 糖尿病					
クエチアピン		セロクエル	25-750mg/2x	±	++	++	0	+			++				
クロザピン		クロザリル	12.5-600mg/2x	++	0	++	+	++			入院レベル血球減少				
第1世代	ブチロ系	ハロペリドール	セレネース	0.75-20mg/1-3x	++	0	+	++	+	+	注射剤 持続性筋注剤				
	フェノ系	レボメプロマジン	レボトミン	5-200mg/1-3x	±	0	++	+	++	+	筋注剤あり				
	ベンズ系	チアプリド	グラマリール	25-150mg/1-3x	+	0	++	+	+	+					
	その他	ゾテピン	ロドピン	25-450mg/2-3x	+	0	++	+	+	+	てんかん誘発				

■抗うつ薬

	一般名	商品名	用量用法	作用				副作用		備考	
				抗うつ	意欲↑	食欲↑	鎮静	嘔気	便秘		
NaSSA	ミルタザピン	リフレックス	15-45mg/1x眠	++	+	+	++	0	0	性機能障害なし	
SNRI	ベンラファキシン	イフェクサー	37.5-225mg/1x	+	++				0	低用量でSSRI	
	デュロキセチン	サインバルタ	20-60mg/1x朝							禁忌: 尿閉	適応: 疼痛
	ミルナシプラン	トレドミン	12.5-100mg/2x								
SSRI	エスシタロプラム	レクサプロ	10-20mg/1x	+	0	0	0	+	0	禁忌:QT延長	
	セルトラリン	ジェイゾロフト	25-100mg/1x	+							
	パロキセチン	パキシル	5-50mg/1x	++						併用注意:循環器薬 慎重投与:未成年	
	フルボキサミン	ルボックス	25-150mg/2x	+							
その他	スルピリド	ドグマチール	25-600mg/3x	+	+	++	0	0	0	もともと抗精神病薬	
	トラゾドン	デジレル	25-200mg1x	±	±	+	++	+	0	睡眠補助	
四環系	ミアンセリン	テトラミド	10-60mg/1x								0
三環系	イミプラミン	トフラニール	30-250mg/3x	++	+	+	+	0	++	禁忌: 緑内障 尿閉	
	アミトリプチリン	トリプタノール	30-250mg/3x			++	++				
	クロミプラミン	アナフラニール	30-250mg/3x			+	+				
	アモキサピン	アモキサン	30-150mg/3x			+	++				+

■抗認知症薬

	一般名	商品名	用量用法	適応			副作用	備考
				軽度	中等度	高度		
コリン作動薬	ドネペジル	アリセプト	3→5mg/1x(1-2w) 5-10mg/1x	○	○	○	下痢 興奮	
	ガランタミン	レミニール	8→16mg/2x(4w) 16-24mg/2x	○	○	×		貼付剤
	リバスチグミン	イクセロン リバスタッチ	4.5→9→13.5 →18mg(4w)					
NMDA拮抗薬	メマンチン	メマリー	5→10→15 →20mg/1x(1w)	×	○	○	めまい	

□使用例

		薬剤
初期	抑うつ	アリセプト、レミニール、イクセロン
	興奮	メマリー
中期～後期		アリセプト増量＋メマリー

□使用例

		薬剤
うつ不安	軽度	レクサプロ、ジェイゾロフト
	中等度～重度	リフレックス
意欲低下		サインバルタ、イフェクサー
うつ不安＋意欲低下		イフェクサー、サインバルタ、
パニック発作		ジェイゾロフト、パキシル、ルボックス
食欲低下		ドグマチール、リフレックス
うつ不眠		デジレル、テトラミド、リフレックス
強迫		パキシル、ルボックス
疼痛		サインバルタ、トレドミン
高齢		ジェイゾロフト、ドグマチール少量

※注意

賦活症候群(特にSSRI)・・・不安、焦燥、衝動性→自殺リスク
 急激な増量→セロトニン症候群・・・低血糖様症状
 急激な減少→中断症候群・・・感冒様症状